



**Lontrel<sup>®</sup> 72**

**HERBICIDA**

Gránulos Solubles en Agua (SG)

Composición: Clopiralida 72 % p/p (en forma de sal amina)

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

**GRUPO 0 HERBICIDA**

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO  
AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

**CONTENIDO NETO: 500 G e**

Fecha y lote de fabricación: ver envase

Inscrito en el R.O.P.F. con el N.º 25.721 por:  
Corteva Agriscience Spain S.L.U.  
Campus Tecnológico Corteva Agriscience  
Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6  
41309 La Rinconada (Sevilla)  
Tel.: 954 29 83 00  
www.corteva.es



<sup>TM</sup> Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

0111027612106

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

**LONTREL® 72** es un herbicida de acción foliar para eliminar malas hierbas de hoja ancha en cereales, maíz, hortalizas del género *Brassica*, remolacha azucarera y forrajera y colza.

#### APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar para el control de malas hierbas dicotiledóneas en postemergencia, realizando una única aplicación por campaña, mediante pulverización normal a baja presión, manualmente o mediante tractor.

- **Cereales (de invierno, primavera y verano):** aplicar desde el iniciado de ahijado del cereal (BBCH 21) hasta el estadio de hoja bandera (BBCH 39), a la dosis de 110-140 g/ha.
- **Colza y Hortalizas del género *Brassica*:** tratar en las primeras etapas de desarrollo de las malas hierbas, cuando el cultivo esté entre 2 y 9 hojas (BBCH 12-19), a la dosis de 170-210 g/ha.

- **Maíz:** aplicar cuando el maíz esté entre 3 y 6 hojas de desarrollo (BBCH 13-16), a la dosis de 110-140 g/ha.
- **Remolacha azucarera y forrajera:** aplicar el producto en las primeras etapas de desarrollo de las malas hierbas a la dosis de 110-210 g/ha.

**LONTREL 72** es un herbicida de acción foliar efectivo contra un amplio grupo de malas hierbas dicotiledóneas anuales y perennes: manzanilla bastarda (*Anthemis arvensis*), manzanilla común (*Matricaria chamomilla*), zanahoria salvaje (*Daucus carota*), cilantro menor (*Bifora* spp.), cerraja (*Sonchus* spp.), tusilago (*Tussilago farfara*), girasol (*Helianthus annuus*), bardana menor (*Xanthium italicum*), acedera (*Rumex* spp.), cardo cundidor (*Cirsium arvense*), trébol (*Trifolium* spp.), veza (*Vicia* spp.), espuma de mar (*Ammi majus*), hierba mora (*Solanum nigrum*), polígono (*Polygonum* spp.).

Se atenderá a la legislación vigente sobre herbicidas hormonales y se observarán las normas oficiales según autonomías.

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

#### PLAZOS DE SEGURIDAD

Cereales, Colza, Hortalizas del género Brassica, Maíz, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera: No procede.

#### MÉTODO / CONDICIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL CALDO: Agitar bien el

envase antes de usar. Llenar a la mitad el tanque

del equipo de pulverización con agua y añadir la cantidad

necesaria de **LONTREL 72**. Añadir el resto del agua agitando

continuamente para asegurar una mezcla homogénea del producto y

mantener la agitación hasta el final de la aplicación. Utilizar siempre agua

limpia. Preparar el caldo justo antes de la aplicación.

Se evitarán todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 metros por segundo.

#### PRECAUCIONES

- En caso de mezcla con otros compuestos, debe respetarse el plazo de seguridad más largo. Además deben cumplirse las normas de

precaución prescritas para los productos más tóxicos.

- Se advierte del riesgo de residuos del producto procedente de restos de plantas tratadas, en los rastrojos y en el suelo; puede ser fitotóxico para cultivos tales como: soja, guisantes, habas, lentejas y otras leguminosas, girasol, zanahoria y otras umbelíferas y solanáceas.
- Tras la cosecha del cereal se deberá incorporar cuidadosamente el rastrojo.
- No se debe aplicar la paja, el estiércol o el compost obtenido del cereal tratado con **LONTREL 72** para cultivos sobre pacas, mantillo, plantas ornamentales o cultivo de hortalizas.
- El estiércol y el compost que provengan de la paja tratada con **LONTREL 72** deben esparcirse incorporándolos inmediatamente al suelo solamente en otoño antes de cultivos sensibles (patatas, leguminosas y girasoles).

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.

**manipulación:** El aplicador debe utilizar guantes de protección química durante todo el proceso del tratamiento, desde la mezcla / carga hasta la limpieza del equipo, botas (de caucho o poliméricas) y guantes y ropa adecuada en caso de tener que manipular los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento. - No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. - SPo 2: Lávese toda la ropa de protección


después de usarla.

**Mitigación de riesgos medioambientales:** SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

**Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.**

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro

control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



**GESTIÓN DE ENVASES:** Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



**Lontrel<sup>®</sup> 72**

**HERBICIDA**

Gránulos Solubles en Agua (SG)

Composición: Clopiralida 72 % p/p (en forma de sal amina)

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según HRAC:

**GRUPO 0 HERBICIDA**

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO  
AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

**CONTENIDO NETO: 500 G e**

Inscrito en el R.O.P.F. con el N.º 25.721 por:

Corteva Agriscience Spain S.L.U.

Campus Tecnológico Corteva Agriscience

Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6

41309 La Rinconada (Sevilla)

Tel.: 954 29 83 00

www.corteva.es

<sup>L</sup> <sup>TM</sup> ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa sobre el envase en el momento de compra.



Fecha y lote de fabricación: ver envase



3 362130 145066 >